

# Ce qu'il faut savoir sur la syphilis

## Santé publique — Fiche d'information

### Qu'est-ce que la syphilis?

La syphilis est une infection transmissible sexuellement provoquée par une bactérie. Elle peut entraîner des complications à long terme si elle n'est pas traitée correctement. La mère ou le parent biologique atteint de syphilis peut transmettre l'infection à son futur bébé, ce qui entraîne parfois de graves problèmes de santé ou le décès du futur bébé.

### Comment la syphilis se transmet-elle?

La syphilis peut se transmettre par contact direct avec une plaie syphilitique au moment de relations sexuelles vaginales, anales ou orales. Les plaies peuvent se trouver sur le pénis, le vagin, l'anus, dans le rectum ou sur les lèvres et dans la bouche.

La mère ou le parent biologique atteint de syphilis peut également transmettre l'infection à son futur bébé. Cette situation s'appelle la **syphilis congénitale**. L'allaitement ne présente pas de risque, sauf en cas de plaie sur le sein de la mère.

### Suis-je à risque de contracter la syphilis?

Toute personne sexuellement active peut contracter la syphilis lors de relations sexuelles vaginales, anales ou orales.

### La syphilis est-elle fréquente?

Les taux de syphilis infectieuse et de syphilis congénitale augmentent. Pour obtenir des renseignements à jour et connaître les tendances récentes, consulter la page (en anglais seulement) :

[www.gov.mb.ca/health/publichealth/surveillance/stbbi/index.html](http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/surveillance/stbbi/index.html)

### Qui doit faire un test de dépistage de la syphilis?

Vous devez faire régulièrement un test de dépistage de la syphilis si vous êtes sexuellement actif.

**Pendant la grossesse**, un dépistage de la syphilis doit être effectué à trois reprises.

Le dépistage est simple et rapide. Il consiste à prendre un prélèvement sur une plaie syphilitique ou à effectuer une analyse de sang. De nombreuses personnes ne présentent pas de symptômes, ou leurs plaies peuvent être difficiles à voir. Il est donc important de faire souvent des tests de dépistage si vous êtes sexuellement actif.

### La syphilis peut-elle être guérie?

Oui, la syphilis peut être guérie à l'aide des bons antibiotiques, qui sont fournis gratuitement par votre fournisseur de soins de santé. Toutefois, le traitement peut ne pas réparer les dommages que l'infection a déjà causés.

### Quel est le traitement de la syphilis?

La syphilis est facile à soigner pendant les premiers stades. Une seule injection de pénicilline, un antibiotique, permet de guérir une personne atteinte de syphilis depuis moins d'un an. Des doses additionnelles sont nécessaires pour traiter une personne atteinte de syphilis depuis plus d'un an. Les personnes allergiques à la pénicilline ont à leur disposition d'autres antibiotiques pour traiter la syphilis.

Des analyses de sang de suivi sont nécessaires pour s'assurer de la réussite du traitement.

Après le traitement, vous devez éviter les rapports sexuels sans préservatif jusqu'à sept jours après la fin du traitement et jusqu'à ce que toutes les plaies syphilitiques soient complètement guéries. Vous devrez également éviter tout contact sexuel avec votre ou vos partenaires jusqu'à ce qu'ils aient fait un test de dépistage et aient été traités si nécessaire.

En cas de suspicion de syphilis congénitale, les bébés peuvent avoir besoin d'un traitement à la pénicilline par voie intraveineuse pendant dix jours. Votre fournisseur de soins de santé peut vous orienter vers un spécialiste en pédiatrie pour des soins supplémentaires.

### J'ai été traité. Est-ce que je peux contracter la syphilis de nouveau?

Oui. Le fait d'avoir la syphilis une fois ne vous protège pas contre une nouvelle infection. Même après avoir été traité avec succès, vous pouvez être réinfecté.

Comme les plaies syphilitiques peuvent être cachées dans le vagin, dans l'anus, sous le prépuce du pénis ou dans la bouche, il n'est pas toujours évident de savoir si vous ou votre partenaire sexuel avez la syphilis. À moins que vous ne soyez certain de votre statut ou que votre ou vos partenaires sexuels aient fait un test de dépistage et aient été traités, vous risquez de transmettre ou de contracter de nouveau la syphilis.

### Comment prévenir la syphilis?

Si vous êtes sexuellement actif, les mesures suivantes peuvent réduire vos risques de contracter la syphilis.

- Utilisez correctement les préservatifs chaque fois que vous avez des rapports sexuels. Les préservatifs évitent la transmission de la syphilis en empêchant le contact avec une plaie. Parfois, des plaies apparaissent dans des zones non couvertes par un préservatif. Le contact avec ces plaies peut transmettre la syphilis.
- Veillez à faire régulièrement des tests de dépistage de la syphilis pour vous et votre ou vos partenaires sexuels. Dites à votre ou vos partenaires si vous avez la syphilis et demandez-leur de vous dire s'ils l'ont.

# Ce qu'il faut savoir sur la syphilis

- Évitez de consommer de l'alcool et des drogues, qui pourraient entraîner un comportement sexuel à risque.

Si vous avez une plaie ou une éruption cutanée, en particulier dans la région de l'aîne, ou si vous avez un écoulement inhabituel de votre pénis ou de votre vagin, n'ayez pas de rapports sexuels et consultez immédiatement votre fournisseur de soins de santé.

## Comment mon fournisseur de soins de santé saura-t-il si j'ai la syphilis?

La plupart du temps, une analyse de sang est utilisée pour dépister la syphilis. Les personnes qui ont eu la syphilis auront toujours un résultat positif à certaines des analyses de sang utilisées pour diagnostiquer la syphilis. Les analyses de sang peuvent faire la différence entre une nouvelle infection et une infection qui a déjà été traitée.

## Comment savoir si j'ai la syphilis?

Les symptômes de la syphilis sont divisés en plusieurs stades :

### Stade primaire

Au cours du premier stade (stade primaire), la syphilis se manifeste le plus souvent par une ou plusieurs plaies indolores à l'endroit où la syphilis a pénétré dans l'organisme. La plaie peut se trouver dans le vagin, la bouche ou l'anus, et peut facilement passer inaperçue.

La plaie peut durer de 3 à 90 jours et guérit avec ou sans traitement. Même si la plaie disparaît, un traitement est nécessaire pour empêcher l'infection de passer au stade secondaire et de se transmettre à d'autres personnes, y compris à votre bébé si vous êtes enceinte.

### Stade secondaire

La caractéristique la plus courante de ce stade est une éruption cutanée. L'éruption peut apparaître n'importe où, y compris sur la paume des mains ou la plante des pieds. L'éruption est parfois si légère qu'elle passe inaperçue.

D'autres symptômes peuvent inclure de la fièvre, des lésions cutanées, une inflammation des ganglions lymphatiques, des maux de gorge, une perte de cheveux par endroits, des maux de tête, une perte de poids, des douleurs musculaires et une sensation de fatigue.

Les symptômes de ce stade disparaissent avec ou sans traitement, mais comme pour le stade primaire, un traitement doit être suivi pour prévenir les stades tardifs de la syphilis et éviter de transmettre l'infection à d'autres personnes.

### Stades latent et tardif

Le stade latent de la syphilis commence lorsque tous les symptômes antérieurs disparaissent. Sans traitement, la syphilis peut continuer à infecter l'organisme pendant des années sans aucun signe ou symptôme. Si vous êtes enceinte,

vous pouvez encore transmettre l'infection à votre bébé. Au cours de la première année de ce stade, vous pouvez infecter vos partenaires sexuels même si vous n'avez aucun symptôme.

La syphilis tardive est très grave et peut se développer de 10 à 30 ans après le début de l'infection.

La syphilis peut envahir le système nerveux à n'importe quel stade de l'infection et provoquer toute une série de symptômes, notamment des maux de tête, des problèmes oculaires et auditifs, un changement de comportement et des troubles du mouvement. Cette situation s'appelle la « neurosyphilis ». La syphilis peut également causer des dommages aux organes internes, comme le cœur et les artères. Ces dommages peuvent entraîner la mort.

### Syphilis congénitale

Pendant la grossesse, la mère ou le parent biologique, à n'importe quel stade de la syphilis, peut transmettre l'infection à son futur bébé. Le traitement de la syphilis au début de la grossesse est très efficace pour prévenir la syphilis. Plus tôt l'infection est traitée, moins la syphilis risque de se transmettre au bébé.

Un bébé infecté peut mourir dans l'utérus (enfant mort-né) ou naître prématurément avec ou sans anomalies congénitales causées par l'infection. Les bébés nés avec une syphilis congénitale peuvent avoir une déformation des os, une faible numération globulaire, une hypertrophie du foie ou de la rate, un jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse), des problèmes cérébraux et nerveux comme la cécité et la surdité, une infection de l'enveloppe du cerveau (méningite) ou des éruptions cutanées.

De nombreux bébés ne présentent aucun symptôme à la naissance. Cependant, si le bébé ne reçoit pas de traitement immédiatement, il peut développer de graves problèmes de santé en quelques semaines.

Après l'âge de deux ans, des symptômes plus graves peuvent apparaître, notamment une anomalie des dents de devant, la cécité et une perte auditive soudaine.

## Où puis-je obtenir plus de renseignements?

Pour obtenir plus de renseignements ou des réponses à vos questions, vous pouvez parler à votre fournisseur de soins de santé ou téléphoner à Health Links — Info Santé au 204 788-8200 ou au numéro sans frais 1 888 315-9257.